



D.G.Calidad Ambiental.

PARDILLA

Clitocybe nebularis (Bat.: Fr.) Kumm.

Clase: Basidiomicetos

Orden: Tricholomatales

Familia: Tricholomáceas

Descripción

La seta de brezo o pardilla es muy común en la mitad septentrional de la Península. El sombrero alcanza unas dimensiones de 6 a 20 cm de diámetro, y es de color pardo grisáceo, recordando al color de las nubes un día plomizo de tormenta. El pie es de aspecto robusto, más pálido que el sombrero. Las láminas, color crema sucio, son desiguales y algo arqueadas tendiendo a ser decurrentes. Presentan la esporada blanca.

Hay que saber diferenciarla bien de la pérfida o engañosa *Entoloma lividum*, fijándonos en las láminas escotadas de la pérfida y el color salmón de su esporada. Las esporas en masa de la pardilla, en cambio, son siempre blancas.

Hábitat

Aparece de forma general formando grandes corros al borde de los pinares, hayedos y robledales y en zonas de prados de montaña entre los brezos y bojés, así como en linderos y caminos. Se localiza en otoño desde septiembre hasta noviembre. Crece tanto en terrenos bien iluminados como en los hayedos más sombríos y en suelos calizos o silíceos.

En los hayedos de La Reserva se produce de forma muy abundante y no es prácticamente recogida, aparece en setales de forma muy abundante. Se pueden coger varios cientos de kilos en un día (Munilla y Enciso). También aparece en los encinares del Linares.

Curiosidades

Esta especie se caracteriza por un fuerte olor dulzón. Hay personas sensibles a la degustación de esta especie produciendo trastornos alérgicos. Por esto es aconsejable tirar el primer agua de su cocción y vigilar la primera ingestión.

La recolección debe realizarse rápidamente ya que una vez que adquieren un tamaño considerable son atacadas por larvas rápidamente, en dos días.

Los precios medios de venta son entre los 15-18 €/kg.