

CONTROL FITOSANITARIO
NORMA TÉCNICA FRUTALES DE PEPITA
PRODUCCIÓN INTEGRADA

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y MEDIO AMBIENTE**



**Gobierno
de La Rioja**

Fecha de Actualización: Mayo 2019

En este documento se especifican los umbrales de tolerancia que será necesario superar para justificar un tratamiento fitosanitario con pesticidas de síntesis tras observar, como mínimo en 50 árboles por unidad de control, el tamaño de muestra que para cada fitoparásito y época se determina. Así mismo se indican las capturas mínimas en trampa sexual que justificarían el tratamiento, colocando una trampa por unidad de control. Los fitosanitarios que figuran en las tablas son específicos para el fitoparásito y el momento de control indicados. Habitualmente la unidad de control es la parcela, si ésta es homogénea e inferior a 4 hectáreas, de manera que si es superior debe ser dividida en unidades de control inferiores a dicha superficie.

En cualquier caso, la utilización de fitosanitarios deberá ajustarse a las autorizaciones y condiciones de uso contempladas en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, incluidas las modificaciones publicadas con posterioridad a la edición de este documento.

MANZANO. Plagas

CONTROL INVERNAL/PREFLORAL (hasta el estado fenológico E)

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Araña roja (<i>Panonychus ulmi</i>)	100 rugosidades en madera de 2 años. Huevos.	5 huevos / rugosidad.		aceite de parafina clofentezin	Prefloración.	
Piojo de San José (<i>Comstockaspis perniciososa</i>)	100 brindillas, mirar los 20 cm de la base. Ninfas.	Presencia ó Presencia y/o daños en la cosecha anterior.	Marcar durante la poda los árboles afectados.	aceite de parafina azadiractin fenoxicarb piriproxifen	Como mínimo 30 días antes del aceite. Hasta el estado E.	Efectuar tratamientos localizados sobre los árboles afectados.
Sesia (<i>Synanthedon myopaeformis</i>)	20% de los árboles de la parcela. Larvas.	10% de ocupación.		feromonas de síntesis (2) triflumuron	Hasta el estado E.	Efectuar tratamientos localizados sobre los árboles afectados.
Zeuzera (<i>Zeuzera pyrina</i>)	20% de los árboles de la parcela. Larvas.			feromonas de síntesis (2) triflumuron	Hasta el estado E.	Efectuar tratamientos localizados sobre los árboles afectados.
Pulgonos (todas las especies)	50 árboles completos, mirar las raíces y el cuello. 200 corimbos. Ninfas.	5% de ocupación. Presencia.		aceite de parafina acetamiprid cipermetrin lambda cihalotrin taufaluvalinato tiacloprid	Hasta el estado E.	
Orugas (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> y <i>Pandemis heparana</i>)	200 corimbos. Larvas.	Presencia ó más del 1% de frutos atacados en la cosecha anterior.		azadiractin bacillus thuringiensis clorantraniliprol fenoxicarb fosmet metoxifenocida tebufenocida triflumuron		

CONTROL POSTFLORAL (desde caída de pétalos hasta fin de abril)

FITOPARASITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Pulgones (<i>todas las especies</i>)	200 corimbos ó brotes. <i>Ninfas y adultos.</i>	Presencia.		aceite de parafina acetamiprid azadiractin cipermetrin clotianidina flonicamid lambda cihalotrin pimetrozina pirimicarb spirotetramat sulfoxaflor tafluvalinato tiacloprid	Al superar el umbral.	
Minadora (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	100 hojas. <i>Huevos.</i>	3% hojas ocupadas ó Más del 10% de hojas con minas (no parasitadas) en el control del otoño anterior.		acetamiprid betaciflutrin deltametrin	Al superar el umbral.	

CONTROLES DESDE MAYO HASTA LA RECOLECCIÓN

FITOPARASITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Araña roja (<i>Panonychus ulmi</i>)	100 hojas. <i>Formas móviles.</i>	70% de ocupación.	Control biológico por fitoseidos presentes de forma natural en el huerto.	abamectina aceite de parafina azadiractin azufre beauveria bassiana clofentezin etoxazol fenpiroximato hexitiazox spirodiclofen	Al superar el umbral.	
Eriófidos (<i>Aculus schlechtendali</i>)	100 brotes. <i>Ninfas y adultos.</i>	20% de ocupación en árboles < 5 años. 40% de ocupación en árboles > 5 años.		azadiractin azufre	Al superar el umbral.	
Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>)	200 brotes, anotar el nº de hojas ocupadas. <i>Ninfas y adultos.</i>	4 hojas ocupadas por brote ocupado ó Peligro de melaza sobre los frutos.		aceite de parafina acetamiprid azadiractin cipermetrin lambda-cihalotrin pirimicarb spirotetramat sulfoxaflor taufluvalinato tiacloprid	Al superar el umbral.	
Minadora (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	100 hojas. <i>Minas.</i>	5% de hojas con minas.		azadiractin clorantraniliprol fosmet lambda cihalotrin triflumuron	Al superar el umbral.	
Orugas (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> y <i>Pandemis heparana</i>)	100 brotes. <i>Larvas.</i> Trampa sexual. <i>Adultos.</i>	10% de ocupación. 25 capturas por semana.		azadiractin bacillus thuringiensis clorantraniliprol fenoxicarb fosmet metil-clorpirifos metoxifenocida tebufenocida triflumuron	Al superar el umbral de brotes atacados por larvas o de adultos en trampas de feromonas. Cuando las larvas estén en el último estadio si se utiliza "fenoxicarb".	

CONTROLES DESDE MAYO HASTA LA RECOLECCIÓN (continuación)

FITOPARASITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	1000 frutos. <i>Galerías recientes.</i> Trampa sexual. <i>Adultos.</i>	1% de frutos con daño reciente. 3 capturas por semana hasta el 15 de junio. 2 capturas por semana desde el 15 de junio.	Confusión sexual.	bacillus thuringiensis betaciflutrin clorraniliprol fenoxicarb feromonas de síntesis (2) fosmet lambda cihalotrin metil-clorpirifos metoxifenocida spinosad tebufenocida tiacloprid triflumuron virus de la granulosis de la carpocapsa	Con los productos ovicidas en el momento de superar el umbral. Con los productos larvicidas de 5 a 12 días después de superar el umbral, según la época.	Atender las recomendaciones del Boletín de Avisos Fitosanitarios.
Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Trampa sexual. <i>Adultos.</i>	1 captura por día.		azadiractin betaciflutin lambda cihalotrin lufenuron (1)	Al superar el umbral.	Atender las recomendaciones del Boletín de Avisos Fitosanitarios.

CONTROL DE RECOLECCIÓN

FITOPARASITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Piojo de San José (<i>Comstockaspis perniciosus</i>)	1000 frutos de la parte alta del árbol. <i>Daños.</i>	Presencia.	Marcar los árboles afectados.		Se realizará el control químico el invierno siguiente.	
Orugas (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> y <i>Pandemis heparana</i>)	1000 frutos. <i>Daños.</i>	1% de daños.			Se realizará el control químico la primavera siguiente.	
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	1000 frutos. <i>Daños.</i>	1% de daños.				

CONTROL DE OTOÑO

FITOPARASITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Minadora (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	500 hojas <i>Minas no parasitadas.</i>	10% de hojas con minas no parasitadas.			Se realizará el control químico la primavera siguiente.	

PERAL. Plagas

CONTROL INVERNAL/ PREFLORAL (hasta el estado fenológico E)

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Araña roja (<i>Panonychus ulmi</i>)	100 rugosidades en madera de 2 años. Huevos.	5 huevos / rugosidad.		aceite de parafina clofentezin	Prefloración.	
Piojo de San José (<i>Comstockaspis perniciososa</i>)	100 brindillas, mirar los 20 cm de la base. Ninfas.	Presencia ó presencia y/o daños en la cosecha anterior.	Marcar durante la poda los árboles afectados.	aceite de parafina azadiractin fenoxicarb piriproxifen	Como mínimo 30 días antes del aceite. Hasta el estado E.	Efectuar tratamientos localizados sobre los árboles afectados.
Psila (enero/febrero) (<i>Cacopsylla pyri</i>)	Golpeo en 50 árboles, 3 golpes/árbol. Adultos.	6 adultos/parcela.		betaciflutrin caolín cipermetrin deltametrin esfenvalerato	Hasta el estado C ₃ . Hasta caída de pétalos	
Sesia (<i>Synanthedon myopaeformis</i>)	20% de los árboles de la parcela. Larvas.	10% de ocupación.		triflumuron	Hasta el estado E	Efectuar tratamientos localizados sobre los árboles afectados.
Cossus (<i>Cossus cossus</i>)	20% de los árboles de la parcela. Larvas.	1% de ocupación.		triflumuron	Hasta el estado E.	Efectuar tratamientos localizados sobre los árboles afectados.
Ácaro blanco (<i>Epirimerus pyri</i>)	50 yemas. Hembras adultas.	Presencia.		azadiractin azufre	Hasta el estado C. Hasta el estado E.	
Orugas (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> y <i>Pandemis heparana</i>)	200 corimbos. Larvas.	Presencia ó más del 1% de frutos atacados en la cosecha anterior.		azadiractin bacillus thuringiensis cipermetrin esfenvalerato fenoxicarb metoxifenocida	Se realizará el control químico después de la floración. Al superar el umbral.	
Psila (<i>Cacopsylla pyri</i>) (en floración)	200 corimbos. Ninfas y huevos.	10% de ocupación.		aceite de parafina caolín	Al superar el umbral. Hasta caída de pétalos	

CONTROL POSTFLORAL (desde caída de pétalos hasta fin de abril)

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Pulgones (todas las especies, excepto el verde)	200 corimbos ó brotes. <i>Ninfas y adultos.</i>	2% de ocupación.		aceite de parafina acetamiprid azadiractin cipermetrin deltametrin esfenvalerato flonicamid lambda cihalotrin pimetrozina pirimicarb spirotetramat sulfoxaflor taufluvalinato tiacloprid	Al superar el umbral.	
Psila (<i>Cacopsylla pyri</i>)	200 corimbos ó brotes. <i>Ninfas y huevos.</i>	10% corimbos ó brotes ocupados.		abamectina aceite de parafina acetamiprid betaciflutrin beuveria bassiana dodecilbenceno sulfonato amónico fenoxicarb lambda cihalotrin spinetoram spirotetramat taufluvalinato tiacloprid	Al superar el umbral.	
Hoplocampa (<i>Hoplocampa brevis</i>)	200 corimbos. <i>Larvas.</i>	5% corimbos ocupados.		betaciflutrin deltametrin	Al superar el umbral.	
Minadora (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	100 hojas. <i>Huevos.</i>	10% de ocupación.		acetamiprid clorantraniliprol esfenvalerato spinetoram	Al superar el umbral.	

CONTROLES DESDE MAYO HASTA LA RECOLECCIÓN

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Araña roja (<i>Panonychus ulmi</i>)	100 hojas. <i>Formas móviles.</i>	70% de ocupación.	Control biológico por fitoseidos presentes de forma natural en el huerto.	abamectina aceite de parafina azadiractin clofentezin fenpiroximato hexitiazox	Al superar el umbral.	
Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>)	200 brotes, anotar el nº de hojas ocupadas. <i>Ninfas y adultos.</i>	4 hojas ocupadas por brote ocupado ó Peligro de melaza sobre los frutos.		aceite de parafina acetamiprid azadiractin cipermetrin esfenvalerato lambda cihalotrin pirimicarb spirotetramat tauflualinato tiaclopid	Al superar el umbral.	
Psila (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 brotes. Todos.	15% de ocupación.		abamectina aceite de parafina acetamiprid azadiractin betaciflutrin beuveria bassiana dodecibenceno sulfonato amónico fenoxicarb fenpiroximato fosmet spinetoram tauflualinato tiaclopid triflumuron	Al superar el umbral.	
Minadora circular (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	100 hojas. Minas.	15% de hojas con minas.		azadiractin clorantraniliprol fosmet lambda cihalotrin spinetoram triflumuron	Al superar el umbral.	

CONTROLES DESDE MAYO HASTA LA RECOLECCIÓN (continuación)

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Orugas (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> y <i>Pandemis heparana</i>)	100 brotes. <i>Larvas.</i> Trampa sexual. <i>Adultos.</i>	10% de ocupación. 25 capturas por semana.		azadiractin bacillus thuringiensis deltametrin fenoxicarb fosmet metoxifenocida tebufenocida triflumuron zeta cipermetrin	Al superar el umbral de brotes atacados por larvas o de adultos en trampas de feromonas. Cuando las larvas estén en el último estadio si se utiliza "fenoxycarb".	
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	1000 frutos. <i>Galerías recientes.</i> Trampa sexual. <i>Adultos.</i>	1% de frutos con daño reciente. 4 capturas por semana hasta el 15 de junio. 3 capturas por semana desde el 15 de junio.		bacillus thuringiensis betaciflutrin cipermetrin clorantraniliprol deltametrin fenoxicarb feromonas de síntesis (2) fosmet lambda cihalotrin metil-clorpirifos metoxifenocida spinetoram spinosad tebufenocida tiacloprid triflumuron virus de la granulosis de la carpocapsa	Con los productos ovicidas en el momento de superar el umbral. Con los productos larvicidas de 5 a 12 días después de superar el umbral, según la época.	
Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Trampa sexual. <i>Adultos.</i>	1 captura por día.		azadiractin betaciflutrin deltametrin lamba cihalotrin lufenuron (1)	Al superar el umbral.	

CONTROL DE RECOLECCIÓN

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO.	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Piojo de San José (<i>Comstockaspis perniciosus</i>)	1000 frutos de la parte alta del árbol. <i>Daños.</i>	Presencia.	Marcar los árboles afectados.		Se realizará el control químico el invierno siguiente.	
Orugas (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> y <i>Pandemis heparana</i>)	1000 frutos. <i>Daños.</i>	1% de daños.			Se realizará el control químico la primavera siguiente.	
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	1000 frutos. <i>Daños.</i>	1% de daños.				
Pulgones	1000 frutos. <i>Daños.</i>	> 1% de daños.			Se realizará el control químico (3 aplicaciones) la primavera siguiente.	

CONTROL DE OTOÑO

FITOPARÁSITO	MUESTRA MÍNIMA. ESTADO	UMBRAL DE TOLERANCIA	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Minadora (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	500 hojas. <i>Minas no parasitadas.</i>	20% de hojas con minas no parasitadas.			Se realizará el control químico la primavera siguiente.	

NOTAS

- (1) Sólo formulación en cebo listo para su uso (3RB).
(2) Confusión sexual.

MANZANO. Enfermedades

FITOPARÁSITO	CRITERIO DE INTERVENCIÓN	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
<p>Moteado (<i>Venturia inaequalis</i>)</p>	<p>Durante todo el periodo receptivo del manzano: desde D₃ hasta mediados de junio, siempre que se den condiciones favorables (lluvias o rocíos frecuentes y temperaturas suaves).</p> <p>A partir de mediados de junio hasta recolección sólo habría que tratar las parcelas con inóculo (donde hay hojas o/y frutos afectados) y si el tiempo es húmedo, para evitar reinfecciones. En tal caso, se trataría en las 24 horas siguientes a las lluvias, o si hay rocío frecuente, cada 10 días, y siempre con productos de contacto, pues los sistémicos pueden provocar resistencias al aplicarlos sobre manchas declaradas.</p>	<p>Eliminación de ramas afectadas de chancros.</p> <p>Evitar riegos por aspersión y capas herbáceas de gran desarrollo.</p> <p>Aplicar urea cristalizada a caída de hojas (con un tercio de hojas caídas, salvo en variedades que pueda producir fitotoxicidad, que habría que esperar al 80% de hojas en el suelo), mojando también el suelo.</p>	<p>De contacto o Preventivos: <i>Impiden las contaminaciones. Persistencia de 7 días.</i> <i>Son lavados por lluvia superior a 10 l/m².</i> captan carbonato de hidrógeno de potasio cobre ditianona + pirimetanil kresoxim-metil + difenoconazol mancozeb metiram propineb oxiclورو de cobre</p> <p>Penetrantes o de Stop: <i>Evitan que la contaminación penetre en la planta. Persistencia de 7-9 días.</i> <i>No se lavan después de 1 hora.</i> clortalonil ditianona dodina</p> <p>Curativos: <i>Impiden la progresión del hongo después de la contaminación. Persistencia de 10-12 días.</i> <i>En cuanto pasa 1 hora de su aplicación ya no son lavados por la lluvia.</i> azufre boscalida + piraclostrobin ciprodinil difenoconazol flutriafol fluopiram + tebuconazol fenbuconazol kresoxim metil metil tiofanato miclobutanil polisulfuro de cal tebuconazol tetraconazol trifloxistrobin</p>	<p>Preventivamente, con tiempo seco, en previsión de que llueva o haya rocío.</p> <p>Emplear dentro de las 36 horas posteriores al comienzo de la lluvia.</p> <p>Aplicar entre las 36 y 72 horas siguientes al comienzo de la lluvia.</p>	<p>Aplicar 1 ó 2 tratamientos preventivos en el periodo prefloral, sobre todo en las variedades más sensibles, para evitar las primeras contaminaciones.</p> <p>No abusar de estos productos, alternarlos con los otros grupos.</p>

MANZANO. Enfermedades (continuación)

FITOPARÁSITO	CRITERIO DE INTERVENCIÓN	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
<p>Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)</p>	<p>Este hongo inverna entre las escamas de las yemas y las primeras infecciones se producen al iniciarse la brotación, por lo que se recomienda un tratamiento preventivo en estado fenológico B-C.</p> <p>A partir del estado fenológico D₃ comenzarán los tratamientos fungicidas, que se repetirán hasta finales de junio.</p> <p>A partir de julio los árboles son poco sensibles a la enfermedad. Sólo habrá que tratar las plantaciones con problemas graves.</p>	<p>Eliminar los brotes oidiados en la poda de invierno.</p> <p>Suprimir también las ramas con oidio en el momento del aclareo o en una pasada específica si el ataque es importante.</p>	<p>polisulfuro de cal</p> <p>Aceite de Naranja</p> <p>Fungicidas del grupo A azufre (añadido a los productos antimoteado) ó</p> <p>Fungicidas del grupo B (para frenar los focos primarios)</p> <p>Fungicidas del grupo A</p> <p>Fungicidas de los grupos B, C y D</p> <p>Grupo A: Fungicidas sin resistencias conocidas: azufre</p> <p>Grupo B: Inhibidores de la biosíntesis del ergosterol: ciflufenamid fluopiram + tebuconazol flutriafol miclobutanil quinoxifen tebuconazol tetraconazol</p> <p>Grupo C: Inhibidores de la biosíntesis de ácidos nucleicos: bupirinato metil-tiofanato</p> <p>Grupo D: Inhibidores de la respiración mitocondrial: trifloxistrobin boscalida + piraclostrobin</p>	<p>Estado B-C.</p> <p>Tratamientos al aire libre durante el BBCH Prefloración.</p> <p>Después de floración.</p> <p>Prefloración. A caída de pétalos y en el estado J.</p> <p>En el resto de los tratamientos hasta el final.</p>	<p>No mezclar con el cobre. Dejar transcurrir al menos 30 días entre tratamientos con aceites y polisulfuros o azufres.</p> <p>Si las plantaciones no están muy afectadas.</p> <p>En plantaciones con mucha infestación.</p> <p>Es conveniente alternar los distintos grupos de fungicidas. No utilizar más de 2 veces al año fungicidas del mismo grupo (excepto los del grupo A), para evitar la aparición de cepas de Oidio resistentes a los mismos.</p>

PERAL. Enfermedades

FITOPARÁSITO	CRITERIO DE INTERVENCIÓN	CONTROLES NO químicos	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO de CONTROL	RECOMENDACIONES
<p>Moteado (<i>Venturia pirina</i>)</p>	<p>Durante todo el periodo receptivo del peral: desde C₃ hasta mediados de junio, siempre que se den condiciones favorables (lluvias o rocíos frecuentes y temperaturas suaves).</p> <p>A partir de mediados de junio hasta recolección sólo habría que tratar las parcelas con inóculo (donde hay hojas o/y frutos afectados) y si el tiempo es húmedo, para evitar reinfecciones (se trataría en las 24 horas siguientes a las lluvias, o si hay rocío frecuente cada 10 días, siempre con productos de contacto, pues los sistémicos pueden provocar resistencias, al aplicarlos sobre manchas declaradas).</p>	<p>Eliminación de ramas afectadas de chancros.</p> <p>Evitar riegos por aspersión y capas herbáceas de gran desarrollo.</p> <p>Aplicar urea cristalizada a caída de hojas (con un tercio de hojas caídas), mojando también el suelo.</p>	<p>De contacto o Preventivos: <i>Impiden las contaminaciones. Persistencia de 7 días. Son lavados por lluvia superior a 10 l/m².</i> captan cobre kresoxim-metil + difenoconazol metiram</p> <p>Penetrantes o de Stop: <i>Evitan que la contaminación penetre en la planta. Persistencia de 7-9 días. No se lavan después de 1 hora.</i> clortalonil (1) ditianona dodina</p> <p>Curativos: <i>Impiden la progresión del hongo después de la contaminación. Persistencia de 10-12 días. En cuanto pasa 1 hora de su aplicación ya no son lavados por la lluvia.</i> azufre boscalida + piraclostrobin carbonato de hidrógeno ciprodinil difenoconazol fluopiram + tebuconazol fenbuconazol kresoxim metil metil-tiofanato miclobutanil polisulfuro de cal tebuconazol tetraconazol trifloxistrobin</p>	<p>Preventivamente, con tiempo seco, en previsión de que llueva o haya rocío.</p> <p>Emplear dentro de las 36 horas posteriores al comienzo de la lluvia.</p> <p>Aplicar entre las 36 y 72 horas siguientes al comienzo de la lluvia.</p>	<p>Aplicar 1 ó 2 tratamientos preventivos en el periodo prefloral, sobre todo en las variedades más sensibles ("Blanquilla", "Mantecosa Hardy", ...), para evitar las primeras contaminaciones.</p> <p>No abusar de estos productos, alternarlos con los otros grupos.</p>

PERAL. Enfermedades (continuación)

FITOPARÁSITO	CRITERIO DE INTERVENCIÓN	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Mancha negra (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Tratar sólo las parcelas donde se hayan visto daños alguna vez (tienen inóculo) o tienen parcelas cercanas con daños.	Evitar riegos por aspersión y capas herbáceas de gran desarrollo, que favorezcan la humectación. Aplicar urea cristalizada a caída de hojas (con un tercio de hojas caídas), mojando también el suelo	bacillus amyloliquefaciens boscalida + piraclostrobin captan ciprodinil + fludioxonil fluopiram + tebuconazol fluxapyrosad kresoxim metil tebuconazol trifloxistrobin	Tratar básicamente de forma preventiva (repetiendo los tratamientos con la frecuencia necesaria para mantener las plantaciones protegidas) en función de la humectación y tª media del periodo de humectación , teniendo en cuenta la persistencia de los productos, así como un posible lavado del tratamiento por lluvias.	Aunque el periodo receptivo del peral va desde caída de pétalos hasta recolección, es importante cubrir sobre todo los periodos de mayor sensibilidad , que son Mayo-Junio y a partir del envero . “Conferencia” es una de las variedades más sensibles.
Septoria (<i>Septoria pyricola</i>)	Desde principios de mayo observar las plantaciones.	Evitar el encharcamiento. No abusar de abonos nitrogenados. Aplicar urea cristalizada a caída de hojas (con un tercio de las hojas caídas), mojando también el suelo.	difenoconazol metil tiofanato metiram	Tratar al ver los primeros síntomas en hojas.	La protección anti-moteado frena en general el desarrollo de esta enfermedad, si bien las variedades sensibles a moteado son poco atacadas por septoriosis y a la inversa.
Roya (<i>Gymnosporangium sabinae/fuscum</i>)	Exceso de humedad, temperatura suave y lluvias prolongadas son las condiciones ideales para la infección. Surge al inicio de la primavera y en otoños lluviosos.	Retirada y quema de hojas y ramas infectadas el año anterior porque contienen esporas listas para repetir la infección. No plantar peral en la proximidad de jardines con sabinas o enebros, desde donde llegan las esporas	Difenoconazol	El control se efectuará a partir de la observación y destrucción de las hipertrofias aparecidas en los huéspedes alternativos.	Tratar a partir del fruto cuajado

FITOPARÁSITO	CRITERIO DE INTERVENCIÓN	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
Chancro (<i>Nectria galligena</i>)	Chancros en zonas terminales de brotes, ramas y tronco. Se inicia cerca de yemas, heridas y cortes de poda. A veces con desprendimiento papiráceo de la piel.	del hongo hasta el peral en primavera. Eliminar brotes afectados como fuente de inóculo. Eliminación de chancros. Proteger las heridas de poda. Proteger las heridas naturales provocadas por la caída de la hoja.	Captan Cobre	Proteger ante períodos lluviosos en primavera y verano.	Se aconseja aplicar en frutales antes de la floración. Aplicar en parada vegetativa.
Fitoftora (<i>Phytophthora cactorum</i>)	Tratar a primeros síntomas.	Evitar plantar en terrenos propensos a inundaciones y encharcamientos prolongados o bien realizar antes de la plantación un buen drenaje. Moderar la fertilización nitrogenada. No efectuar heridas en las raíces y zona basal del tronco.	Fosetil-Al Metalaxil-M		Al inicio de la brotación.
Monilia (<i>Monilia fructigena</i>)	Los periodos más sensibles de los frutales a los ataques de monilia son la floración la fase de la maduración de los frutos.	Eliminación de frutos momificados. Reducción de abonados nitrogenados.	Compuestos cúpricos. Captan Mancozeb Metiram Metil tiofanato Tiram Boscalida + Piraclostrobin Clortalonil	En la caída de hojas y desborre. En periodo prefloral	En campañas con climatología especialmente favorable a la enfermedad, los tratamientos reducen de manera limitada la incidencia de moniliosis, siendo necesario además el variar las materias activas y el modo de acción de los fungicidas utilizados para no favorecer el desarrollo de resistencias.
Pseudomonas (<i>Pseudomonas syringae</i>)	Detección de los primeros corimbos o frutos afectados. En floración los daños son confundibles con Fuego Bacteriano.	Reducir al máximo las condiciones de humedad en la	Compuestos cúpricos	El mayor riesgo se da cuando concurren altas humedades, o lluvia tras	Los tratamientos preventivos pueden atenuar los daños. A partir del estado fenológico

FITOPARÁSITO	CRITERIO DE INTERVENCIÓN	CONTROLES NO QUÍMICOS	CONTROL QUÍMICO	MOMENTO DE CONTROL	RECOMENDACIONES
		plantación, siendo contraproducentes los sistemas de riego por aspersión o microaspersión. Prácticas culturales conducentes al mantenimiento de un buen drenaje en el suelo de la parcelas		producirse a bajas temperaturas.	C3, tratar de forma inmediata después de una helada con materias activa autorizadas.

Herbicidas autorizados en frutales de pepita

Materias activas (%)	IMPACTO AMBIENTAL			MODO DE ACCIÓN		EDAD AÑOS			MONOCOTILEDÓNEAS		DICOTILEDÓNEAS	
	BAJO	MEDIO	ALTO	Preemergencia	Postemergencia	Plantación	Menos de 4 años	Más de 4 años	Anual	Perenne	Anual	Perenne
carfentrazona-etil												
diflufenican + glifosato												
diflufenican + oxifluorfen												
diquat												
glifosato												
glifosato (sal trimésica)												
isoxaben												
napropamida												
oxifluorfen												
pendimetalina												
pirafufen-etil												
quizalozop-p-etil												

Caso de que haya más de un herbicida que pueda resolver el problema en un determinado momento de tratamiento, se seleccionará aquel que tenga el impacto ambiental más bajo.

Siempre que sea posible, se elegirá un momento de aplicación que permita la utilización de materias activas con el impacto ambiental más bajo. Cuando por alguna circunstancia sea necesario recurrir el empleo de un herbicida con impacto ambiental MEDIO o ALTO, se pondrá especial atención en las restricciones de tipo ecotoxicológico que vendrán reflejadas en la etiqueta.

Eficaz 
 Sin eficacia 

LISTA DE MATERIAS ACTIVAS DE REGULADORES DE CRECIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA FISIOPATIA DEL RUSSETING

	REGULADORES DE CRECIMIENTO				ANTI-RUSSETING
	Aclareo	Anticaída	Favorecer Cuajado	Regular vigor	
MANZANO	ANA 6-benzyladenina ANA Amida Metramitrona	ANA ANA + ANA Amida			GA4 + GA7 GA4 + GA7 + 6-benzyladenina
PERAL			GA4 + GA7 + 6-benzyladenina GA3	Prohexadiona de calcio Paclobutrazol*	

* Aplicado al suelo después de la recolección, y en aplicación foliar desde el inicio de floración hasta 30 días después de la caída de pétalos, tratamientos ambos que han de realizarse bajo el control del Técnico responsable de la explotación.

LISTA DE MATERIAS ACTIVAS PARA COMBATIR EL FUEGO BACTERIANO

prohexadiona cálcica
bacillus amyloliquefaciens (subesp. plantarum, cepa D747)
óxido cuproso 50%, óxido cuproso 75%

LISTA DE MATERIAS ACTIVAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS QUE SE PUEDEN EMPLEAR PARA LA FRUTA QUE VAYA A CONSERVARSE DURANTE UN PERIODO SUPERIOR A 90 DÍAS

fludioxonil
imazalil
metil tiofanato
pirimetanil
tiabendazol

En situaciones excepcionales o no contempladas en este documento, se podrá intervenir con prescripción técnica y previa autorización por escrito de la Dirección General Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de La Rioja, haciendo uso de otras materias activas autorizadas en los cultivos.

Lo recogido en este documento se aplicará sin perjuicio de lo que establece el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Es obligación del operador comprobar antes del uso de una materia activa su vigencia en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAPA.