

Boletín de avisos fitosanitarios

Nº 20 | 15 de julio de 2026

Frutales

Mosca de la fruta • *Ceratitis capitata*

Ya se han producido capturas en Rioja Baja y se espera que en los próximos días se produzcan en Rioja Media. En caso de detectar daños será necesario mantener protegidas las plantaciones hasta la recolección realizando tratamientos cada 7 - 10 días con alguno de los productos que se indican a continuación, respetando siempre el plazo de seguridad y los cultivos en los que están autorizados.

Materia activa	Cultivo autorizado	Nombre y casa comercial	P.S
<i>Beauveria bassiana</i> *	melocotonero, ciruelo	Naturalis - Biogard	--
deltametrin (1)	melocotonero, ciruelo, manzano, peral	pr común	3 ó 7
esfenvalerato	melocotón	pr común	3
lambda-cihalotrin (1)	melocotonero, ciruelo, manzano, peral	pr. común	3 ó 7
spinosad*	melocotonero, cerezo, ciruelo, manzano, peral	pr común	7
	melocotonero, ciruelo	Spintor Cebo - Corteva (2)	7

(1) Cultivo autorizado y plazo de seguridad según formulación.

(2) Solo en aplicación por parcheo.

* Materia activa autorizada en producción ecológica.



Daños de mosca de la fruta y larvas en melocotón.

El umbral económico de daños de esta plaga es muy bajo, 1 adulto/trampa y día. Sin embargo, cuando se instalan métodos de control alternativos se eleva a 3-5 adultos/trampa y día. Para reducir la población de adultos y daños es importante retirar toda la fruta que queda tras la recolección, tanto en el suelo como en el árbol.

Además de los insecticidas, otro método de control es el empleo de dispositivos de **captura masiva y atracción y muerte**. En caso de utilizar este método los dispositivos deben estar colocados en la parcela antes de la instalación de la plaga.

Materia activa	Nombre comercial	Cultivo autorizado	Dosis (Trampas/Ha)
deltametrin	Cerapack - SEDQ*	frutales hueso y pepita	50 - 80
	Decis Trap - Bayer*	frutales hueso y pepita	50 - 80
	Delmur Trap - Rainbow*	frutales hueso y pepita	50 - 80
	Biomagnet Ambar - Suttera*	frutales hueso y pepita	50 - 75
esfenvalerato	Kenotrap Complet - Kenogard	frutales hueso y pepita	75
	Moskisan - Sansan	frutales hueso y pepita	
lambda - cihalotrin	Conetrap Ceratitis - Probodelt*	frutales hueso y pepita	50 - 80
	Karate Trap C Box - Syngenta*	frutales hueso y pepita	
proteínas hidrolizadas	Ceratrap - Bioibérica*	frutales hueso y pepita	80 - 100

* Dispositivo autorizado en producción ecológica.



Orificios de salida de las moscas.

Araña roja • *Panonychus ulmi*

Las condiciones meteorológicas actuales con elevadas temperaturas y baja humedad relativa favorecen la aparición de araña roja. La sintomatología que presentan los árboles se manifiesta en hoja principalmente, con una punteadura blanquecina en el haz pudiendo observar las pequeñas arañas en el envés de las hojas. Pasando la coloración de las hojas de verde intenso a verde apagado o plomizo. Cuando el ataque es intenso se produce una pérdida de actividad foliar que puede ocasionar defoliaciones anticipada e influencia sobre el calibre de los frutos. En caso de necesitar realizar algún tratamiento los productos autorizados se encuentran indicados en el [boletín nº12](#).