



Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2018

27 de Febrero de 2020



Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2018 se produjeron 35.229 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 49,6 % correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 42,1 %. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 52,1 %, 43,4 % excluyendo las diagnósticos asociados a la maternidad.

Altas hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	35.229	100,0	17.769	17.460	4.899.954	100,0	2.349.175	2.550.779
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	5.206	14,8	2.891	2.315	635.134	13,0	349.104	286.030
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.844	13,8	2.844	2.000	610.104	12,5	338.413	271.691
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.782	13,6	2.690	2.092	612.066	12,5	348.527	263.539
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.398	9,6	1.688	1.710	442.333	9,0	223.712	218.621
0200 - Neoplasias (Tumores)	3.062	8,7	1.746	1.316	462.956	9,4	246.610	216.346
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.644	7,5		2.644	425.658	8,7		425.658
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.589	7,3	1.321	1.268	350.331	7,1	168.543	181.789
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	2.190	6,2	1.081	1.109	358.795	7,3	167.139	191.656
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	1.461	4,1	788	673	193.319	3,9	103.811	89.508
Resto de causas	5.053	14,3	2.720	2.333	809.258	16,5	403.316	405.941

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato respiratorio" con 5.206, lo que equivale al 14,8 % del total. En España alcanzan el 13 % de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato digestivo" con 4.844 altas (13,8 % del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,5 % del total. "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.782 altas (13,6 % del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 12,5 %.



Estancias hospitalarias

En 2018 se contabilizaron en La Rioja un total de 289.129 estancias hospitalarias, de las que el 54,7% fueron de varones. En España el 51,9% de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 57,7% en La Rioja y al 55,1% en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	289.129	100,0	158.018	131.111	40.563.057	100,0	21.048.584	19.514.473
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	44.868	15,5	24.916	19.952	5.444.507	13,4	3.022.405	2.422.102
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	36.036	12,5	14.892	21.144	3.755.156	9,3	1.763.296	1.991.860
0500 - Transtornos mentales y de comportamiento	35.620	12,3	26.805	8.815	6.660.667	16,4	3.769.864	2.890.803
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	35.179	12,2	19.477	15.702	4.578.978	11,3	2.526.332	2.052.646
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	27.992	9,7	15.960	12.032	3.409.302	8,4	1.878.661	1.530.641
0200 - Neoplasias (Tumores)	26.500	9,2	16.519	9.981	3.795.304	9,4	2.193.600	1.601.703
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	14.709	5,1	7.621	7.088	1.803.976	4,4	900.393	903.584
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	10.456	3,6	6.048	4.408	1.173.734	2,9	677.359	496.375
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	10.439	3,6	4.869	5.570	1.872.925	4,6	814.933	1.057.993
Resto de causas	47.330	16,4	20.911	26.419	8.068.508	19,9	3.501.741	4.566.766

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por diagnóstico principal, "Enfermedades del aparato circulatorio" son las que más estancias provocaron, con un 15,5% del total. Le siguen "Lesiones, envenenamientos y otras causas externas" con el 12,5% y en tercer lugar "Transtornos mentales y de comportamiento" con el 12,3% del total de estancias.



Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2018 fue de 8,2 días, mientras que a nivel nacional llegó a 8,3 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 8,9 días para los hombres (9 días en España) y los 7,5 días en mujeres (7,7 en España).

Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	8,2	8,9	7,5	8,3	9,0	7,6
0500 - Transtornos mentales y de comportamiento	54,3	69,8	32,4	56,4	61,0	51,3
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	12,2	13,5	10,5	6,5	7,9	5,5
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	11,7	10,4	13,1	9,0	9,0	9,1
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	10,6	8,8	12,4	8,5	7,9	9,1
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	10,2	10,2	10,1	10,2	10,6	9,8
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	10,1	10,4	9,7	11,2	10,3	12,1
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,4	9,3	9,5	8,9	8,7	9,2
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9,0	10,7	7,4	7,1	8,6	6,0
0200 - Neoplasias (Tumores)	8,6	9,5	7,6	8,2	8,9	7,4
1200 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	8,1	7,2	9,1	9,1	8,7	9,5


Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Transtornos mentales y de comportamiento" (54,3 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 56,4 días de ingreso como media.



La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 14 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 85 a 89 años y de 90 a 94 años .

Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 95 años y más, con 10,4 días para las mujeres y 12,3 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 90 a 94 años, con 12,4 días para las féminas y 9,3 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 7,7 días para las niñas y a 6 días para los niños.



Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2018, el 87,9% de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 12,1% restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 76,8% y al 23,2% respectivamente.

	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	30.967	87,9	4.262	12,1	222.112	76,8	67.017	23,2
Hombres	15.343	86,3	2.426	13,7	125.745	79,6	32.273	20,4
Mujeres	15.624	89,5	1.836	10,5	96.367	73,5	34.744	26,5
ESPAÑA	3.570.869	72,9	1.329.085	27,1	27.764.954	68,4	12.798.103	31,6
Hombres	1.730.800	73,7	618.375	26,3	14.713.424	69,9	6.335.160	30,1
Mujeres	1.840.069	72,1	710.710	27,9	13.051.529	66,9	6.462.943	33,1

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 89,5% de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 86,3%. A nivel nacional los porcentajes fueron del 72,1% para las mujeres y del 73,7% para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 76,8% se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 68,4% en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 73,5% para las mujeres y al 79,6% para los varones.



Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2018 se produjeron en La Rioja 11.267 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 10.486.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	11.267	10.486
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.665	1.359
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.549	1.306
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.529	1.310
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	1.087	947
0200 - Neoplasias (Tumores)	979	991
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	846	911
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	828	750
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	700	768
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	467	414

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por grupos de enfermedades, en 2018 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato respiratorio", con un valor alcanzado de 1.665 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.359

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato digestivo" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.549 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.306.

Comunidades Autónomas

En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Cataluña (12.222 altas por cada 100.000 habitantes), Aragón (11.813) y Baleares (11.545).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Andalucía (8.403), Castilla - La Mancha (8.569) y Canarias (8.701).

Altas por 100.000 hab. y estancia media		
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	10.486	8,3
Andalucía	8.403	7,0
Aragón	11.813	9,1
Asturias	11.445	8,1
Baleares	11.545	7,0
Canarias	8.701	11,5
Cantabria	10.124	8,4
Castilla y León	11.163	10,6
Castilla-La Mancha	8.569	7,8
Cataluña	12.222	9,6
C. Valenciana	10.360	6,3
Extremadura	10.518	8,7
Galicia	11.199	8,0
Madrid	11.027	7,5
Murcia	10.502	8,2
Navarra	10.559	9,2
País Vasco	11.443	8,7
LA RIOJA	11.267	8,2

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización


Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes



En relación a la estancia media, Canarias (11,51 días), junto con Castilla y León (10,64 días) y Cataluña (9,63 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6,3 días), Andalucía (7 días) y Baleares (7 días).

Estancia media en días





Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevado a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta nueva clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

www.larioja.org/estadistica

Fuente:



 @riojastat