

LABORATORIO REGIONAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Dirección: Ctra. Burgos, Km. 6. Finca "La Grajera". 26071 Logroño (LA RIOJA)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **168/LE399**

Fecha de entrada en vigor: 28/05/1999

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 19 fecha 20/01/2021)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

ÁREA BIOLÓGICA. LÍNEA BIOLOGÍA ALIMENTARIA

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Recuento en placa de microorganismos a 30 °C	ISO 4833-1
	Recuento en placa de enterobacterias a 37 °C	ISO 21528-2
	Recuento en placa de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo	ISO 16649-2
	Recuento en placa de <i>Bacillus cereus</i> presuntivo	ISO 7932
	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-2
	Recuento en placa de <i>Clostridium perfringens</i>	UNE-EN ISO 7937
	Recuento en placa de estafilococos coagulasa positivo	ISO 6888-1
	Detección de <i>Escherichia coli</i> O 157	UNE-EN ISO 16654
Alimentos Hisopos Esponjas	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-1
Alimentos Piensos Hisopos Esponjas Heces de animales y soportes que las contengan (calzas) Polvo	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	ISO 6579-1

ÁREA BIOLÓGICA. LÍNEA BIOLOGÍA ALIMENTARIA

Análisis mediante métodos basados en técnicas PCR

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos Piensos	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por PCR a tiempo real	Met/BA/Salmonella-PCR/1 <i>Método interno basado en MicroSEQ® Salmonella spp.</i>

ÁREA BIOLÓGICA. LÍNEA BIOLOGÍA PECUARIA

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero bovino	Detección de anticuerpos frente a leucosis enzoótica bovina por ELISA	Met/BP/Leucosis1 <i>Método Tipo II de CEA-ENAC-22</i>
Suero porcino	Detección de anticuerpos frente a la proteína gE del virus de Aujeszky por ELISA	Met/BP/Aujeszky/1 <i>Método Tipo II de CEA-ENAC-22</i>
	Detección de anticuerpos frente a Peste Porcina Africana (PPA) por ELISA	Met/BP/PPA/1 <i>Método Tipo II de CEA-ENAC-22</i>
	Detección de anticuerpos frente a Peste Porcina Clásica (PPC) por ELISA	Met/BP/PPC/1 <i>Método Tipo II de CEA-ENAC-22</i>
Suero (bovino, ovino y caprino)	Detección de anticuerpos frente a Lengua Azul por ELISA	Met/BP/Lengua azul/1 <i>Método Tipo II de CEA-ENAC-22</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aglutinación

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero (bovino, ovino y caprino)	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por rosa de Bengala en placa	Met/BP/Brucelosis/1 <i>Método interno conforme a Real Decreto 2611/1996 y sus posteriores modificaciones Anexo 2, Apartado 2.5</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de fijación del complemento

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero (bovino, ovino y caprino)	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por fijación del complemento	Met/BP/Bruceosis/2 <i>Método interno conforme a Real Decreto 2611/1996 y sus posteriores modificaciones Anexo 2, Apartado 2.3</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de parasitología

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Carne fresca y congelada	Detección de larvas de triquina (<i>Trichinella</i> spp.) por digestión péptica y microscopía	Reglamento (UE) 2015/1375 Anexo I Capítulo 1

ÁREA BIOLÓGICA. LÍNEA BIOLOGÍA ESPECIAL

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Sistema nervioso central ovino, caprino y bovino	Detección de proteína prion resistente (PrPres) por ELISA	Met/BE/Prión/4 <i>Método Tipo II de CEA-ENAC-22</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas PCR

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Sangre entera de bovino, ovino y caprino	Detección de ácidos nucleicos del virus de la Lengua Azul por RT-PCR a tiempo real	Met/BE/Lengua azul/1 <i>Método interno basado en PESIG/PCR-01 IESIG/PCR-08 transferido por LNR-LCV</i>
Hisopos orofaríngeos, traqueales y cloacales y heces aviares	Detección de ácidos nucleicos del virus de la Influenza aviar por RT-PCR a tiempo real	Met/BE/Influenza/1 <i>Método interno basado en PESIG/PCR-01 IESIG/PCR-16 transferido por LNR-LCV</i>

ÁREA BIOLÓGICA. LÍNEA BIOLOGÍA VEGETAL

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Vid	Detección del virus del entrenudo corto (GFLV) por ELISA	Met/BV/Vid/1 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/125</i>
	Detección del virus del enrollado serotipo 3 (GLRaV- 3) por ELISA	Met/BV/Vid/2 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/125</i>
	Detección del virus del jaspeado (GFKV) por ELISA	Met/BV/Vid/3 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/125</i>
	Detección del virus del enrollado serotipo 1 (GLRaV-1) por ELISA	Met/BV/Vid/4 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/125</i>
	Detección del virus del mosaico del arabis (ArMV) por ELISA	Met/BV/Vid/5 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/125</i>
Material vegetal	Detección de <i>Erwinia amylovora</i> por ELISA	Met/BV/E. amylovora/2 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/20</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Material vegetal	Detección de <i>Erwinia amylovora</i> por microbiología	Met/BV/E. amylovora/1 <i>Método interno basado en EPPO PM 7/20</i>

ÁREA QUÍMICA. LÍNEA QUÍMICA ALIMENTARIA

Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aceites vegetales	Grado de acidez por volumetría	Met/QA/Aceites/3 <i>Método interno basado en UNE-EN ISO 660</i>
	Índice de peróxidos por volumetría	Met/QA/Aceites/4 <i>Método interno basado en UNE-EN ISO 3960</i>
Aceites de oliva vírgenes	Contenido de impurezas insolubles por gravimetría	Met/QA/Aceites/7 <i>Método interno basado en UNE-EN ISO 663</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas culombimétricas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aceites vegetales	Humedad por valoración culombimétrica (método de Karl-Fischer)	Met/QA/Aceites/8 <i>Método interno basado en UNE-EN ISO 8534</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aceites vegetales	Prueba espectrofotométrica en el ultravioleta (K_{232} , K_{270} , ΔK)	Met/QA/Aceites/5 <i>Método interno basado en ISO 3656</i>

ÁREA QUÍMICA. LÍNEA QUÍMICA DE PRODUCCIÓN

Análisis mediante métodos basados en técnicas volumétricas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suelos	Materia orgánica oxidable por volumetría (método Walkley-Black)	Met/QP/Suelos/2 <i>Método interno basado en BOE-A-1976-6778 Apdo. 25</i>

Análisis físico-químicos

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suelos Compost Lodos Material vegetal	Nitrógeno total por conductividad térmica (método Dumas)	Met/QP/CN/1 <i>Método interno basado en EN 16168</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía infrarroja

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suelos	Carbonatos por calcimetría y cuantificación por espectroscopía infrarroja	Met/QP/Suelos/3 <i>Método interno basado en EN 15936 ISO 10693</i>
Suelos Compost Lodos Material vegetal	Carbono total por espectroscopía infrarroja	Met/QP/CN/1 <i>Método interno basado en EN 15936</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía atómica

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suelos	Elementos por espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) Aluminio $(\geq 100 \text{ mg/kg})$ Boro $(\geq 1 \text{ mg/kg})$ Calcio $(\geq 100 \text{ mg/kg})$ Cobre $(\geq 1 \text{ mg/kg})$ Fosforo $(\geq 10 \text{ mg/kg})$ Hierro $(\geq 50 \text{ mg/kg})$ Magnesio $(\geq 35 \text{ mg/kg})$ Manganeso $(\geq 15 \text{ mg/kg})$ Potasio $(\geq 50 \text{ mg/kg})$ Sodio $(\geq 20 \text{ mg/kg})$ Zinc $(\geq 1,5 \text{ mg/kg})$	Met/QP/Suelos/4 <i>Método interno basado en ISO 22036</i>
Material vegetal	Elementos por espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) Boro $(\geq 5 \text{ mg/kg})$ Calcio $(\geq 0,03 \%)$ Cobre $(\geq 3 \text{ mg/kg})$ Fosforo $(\geq 0,075 \%)$ Hierro $(\geq 25 \text{ mg/kg})$ Magnesio $(\geq 0,02 \%)$ Manganeso $(\geq 4 \text{ mg/kg})$ Potasio $(\geq 0,3 \%)$ Sodio $(\geq 50 \text{ mg/kg})$ Zinc $(\geq 10 \text{ mg/kg})$	Met/QP/Plantas/1 <i>Método interno basado en AOAC 985</i>

ÁREA QUÍMICA. LÍNEA QUÍMICA DE RESIDUOS

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO																										
Aceite de oliva	Perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID)	Met/QR/Aceites/1 <i>Método interno basado en COI/T.20/Doc. Nº 33</i>																										
	<table border="0"> <tr> <td>Ácido Araquídico</td> <td>Ácido Linolénico</td> </tr> <tr> <td>Ácido Behénico</td> <td>Ácido Margárico</td> </tr> <tr> <td>Ácido Eicosenoico</td> <td>Ácido Mirístico</td> </tr> <tr> <td>Ácido Estearico</td> <td>Ácido Oleico</td> </tr> <tr> <td>Ácido Heptadecenoico</td> <td>Ácido Palmítico</td> </tr> <tr> <td>Ácido Lignocérico</td> <td>Ácido Palmítoleico</td> </tr> <tr> <td>Ácido Linoleico</td> <td></td> </tr> </table>	Ácido Araquídico	Ácido Linolénico	Ácido Behénico	Ácido Margárico	Ácido Eicosenoico	Ácido Mirístico	Ácido Estearico	Ácido Oleico	Ácido Heptadecenoico	Ácido Palmítico	Ácido Lignocérico	Ácido Palmítoleico	Ácido Linoleico														
	Ácido Araquídico	Ácido Linolénico																										
Ácido Behénico	Ácido Margárico																											
Ácido Eicosenoico	Ácido Mirístico																											
Ácido Estearico	Ácido Oleico																											
Ácido Heptadecenoico	Ácido Palmítico																											
Ácido Lignocérico	Ácido Palmítoleico																											
Ácido Linoleico																												
Ceras y esteres etílicos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID)	Met/QR/Aceites/2 <i>Método interno basado en COI/T.20/Doc. Nº 28</i>																											
Estigmastadienos por cromatografía líquida con detector visible ultravioleta (CL-UV/VIS)	Met/QR/Aceites/4 <i>Método interno basado en ISO 15788-2</i>																											
Orina Aguas de consumo animal	<p>Determinación cualitativa de hormonas anabolizantes por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)</p> <table border="0"> <tr> <td>17α-Boldenona</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>17β-Boldenona</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>α-Ac.Clormadinona</td> <td>CCα = 1 μg/l</td> </tr> <tr> <td>Dietilestilbestrol</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>Dienestrol</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>Hexestrol</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>α-Ac. Medroxiprogesterona</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>α-Ac. Megestrol</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>α Ac. Melengestrol</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>Taleranol</td> <td>CCα = 1 μg/l</td> </tr> <tr> <td>17β-Trembolona</td> <td>CCα = 1 μg/l</td> </tr> <tr> <td>17α-Trembolona</td> <td>CCα = 0,5 μg/l</td> </tr> <tr> <td>Zeranol</td> <td>CCα = 1 μg/l</td> </tr> </table>	17 α -Boldenona	CC α = 0,5 μ g/l	17 β -Boldenona	CC α = 0,5 μ g/l	α -Ac.Clormadinona	CC α = 1 μ g/l	Dietilestilbestrol	CC α = 0,5 μ g/l	Dienestrol	CC α = 0,5 μ g/l	Hexestrol	CC α = 0,5 μ g/l	α -Ac. Medroxiprogesterona	CC α = 0,5 μ g/l	α -Ac. Megestrol	CC α = 0,5 μ g/l	α Ac. Melengestrol	CC α = 0,5 μ g/l	Taleranol	CC α = 1 μ g/l	17 β -Trembolona	CC α = 1 μ g/l	17 α -Trembolona	CC α = 0,5 μ g/l	Zeranol	CC α = 1 μ g/l	Met/QR/Anabol/1 <i>Método interno conforme a Decisión 2002/657/CE</i>
17 α -Boldenona	CC α = 0,5 μ g/l																											
17 β -Boldenona	CC α = 0,5 μ g/l																											
α -Ac.Clormadinona	CC α = 1 μ g/l																											
Dietilestilbestrol	CC α = 0,5 μ g/l																											
Dienestrol	CC α = 0,5 μ g/l																											
Hexestrol	CC α = 0,5 μ g/l																											
α -Ac. Medroxiprogesterona	CC α = 0,5 μ g/l																											
α -Ac. Megestrol	CC α = 0,5 μ g/l																											
α Ac. Melengestrol	CC α = 0,5 μ g/l																											
Taleranol	CC α = 1 μ g/l																											
17 β -Trembolona	CC α = 1 μ g/l																											
17 α -Trembolona	CC α = 0,5 μ g/l																											
Zeranol	CC α = 1 μ g/l																											

CC α : Límite de decisión según la Decisión de la Comisión 2002/657/CE (DOCE 17/08/2002).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO																																																																																																																
Leche (ovino, bovino, caprino) Músculo	<p>Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)</p> <p>Leche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ovino</th> <th>Bovino</th> <th>Caprino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ác. Tolfenámico</td> <td>CCα=15,0 µg/kg</td> <td>(≥ 25,0 µg/kg)</td> <td>CCα=15,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Fenilbutazona</td> <td>CCα=1,5 µg/kg</td> <td>CCα=1,5 µg/kg</td> <td>CCα=1,5 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Meloxicam</td> <td>CCα= 4,5 µg/kg</td> <td>(≥ 6,0 µg/kg)</td> <td>(≥ 6,0 µg/kg)</td> </tr> <tr> <td>Ác. mefenámico</td> <td>CCα= 3,0 µg/kg</td> <td>CCα= 3,0 µg/kg</td> <td>CCα= 3,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Naproxeno</td> <td>CCα= 3,0 µg/kg</td> <td>CCα= 3,0 µg/kg</td> <td>CCα= 3,0 µg/kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Músculo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bovino</th> <th>Equino</th> <th>Porcino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ác. Mefenámico</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Ác. salicílico</td> <td>(≥ 160µg/kg)</td> <td>(≥ 160µg/kg)</td> <td>CCα = 160 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Ác. tolfenámico</td> <td>(≥ 30 µg/kg)</td> <td>CCα = 20,0 µg/kg</td> <td>(≥ 30 µg/kg)</td> </tr> <tr> <td>Carprofeno</td> <td>(≥ 282 µg/kg)</td> <td>(≥ 282 µg/kg)</td> <td>CCα = 200 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Fenilbutazona</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Flunixin</td> <td>(≥ 6,0 µg/kg)</td> <td>(≥ 6,0 µg/kg)</td> <td>(≥ 6,0 µg/kg)</td> </tr> <tr> <td>Meloxicam</td> <td>(≥ 11,0 µg/kg)</td> <td>(≥ 11,0 µg/kg)</td> <td>(≥ 11,0 µg/kg)</td> </tr> <tr> <td>Naproxeno</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Caprino</th> <th>Conejo</th> <th>Pavo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ác. Mefenámico</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Ác. salicílico</td> <td>(≥ 160µg/kg)</td> <td>(≥ 160µg/kg)</td> <td>(≥ 160 µg/kg)</td> </tr> <tr> <td>Ác. tolfenámico</td> <td>CCα = 20,0 µg/kg</td> <td>CCα = 20,0 µg/kg</td> <td>CCα = 20,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Carprofeno</td> <td>CCα = 200 µg/kg</td> <td>CCα = 200 µg/kg</td> <td>CCα = 200 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Fenilbutazona</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Flunixin</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Meloxicam</td> <td>(≥ 11,0 µg/kg)</td> <td>(≥ 11,0 µg/kg)</td> <td>CCα = 8,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Naproxeno</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Otras especies</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ác. Mefenámico</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Ác. salicílico</td> <td>CCα = 160µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Ác. tolfenámico</td> <td>CCα = 20,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Carprofeno</td> <td>CCα = 200 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Fenilbutazona</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Flunixin</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Meloxicam</td> <td>CCα = 8,0 µg/kg</td> </tr> <tr> <td>Naproxeno</td> <td>CCα = 4,0 µg/kg</td> </tr> </tbody> </table>		Ovino	Bovino	Caprino	Ác. Tolfenámico	CCα=15,0 µg/kg	(≥ 25,0 µg/kg)	CCα=15,0 µg/kg	Fenilbutazona	CCα=1,5 µg/kg	CCα=1,5 µg/kg	CCα=1,5 µg/kg	Meloxicam	CCα= 4,5 µg/kg	(≥ 6,0 µg/kg)	(≥ 6,0 µg/kg)	Ác. mefenámico	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg	Naproxeno	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg		Bovino	Equino	Porcino	Ác. Mefenámico	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	Ác. salicílico	(≥ 160µg/kg)	(≥ 160µg/kg)	CCα = 160 µg/kg	Ác. tolfenámico	(≥ 30 µg/kg)	CCα = 20,0 µg/kg	(≥ 30 µg/kg)	Carprofeno	(≥ 282 µg/kg)	(≥ 282 µg/kg)	CCα = 200 µg/kg	Fenilbutazona	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	Flunixin	(≥ 6,0 µg/kg)	(≥ 6,0 µg/kg)	(≥ 6,0 µg/kg)	Meloxicam	(≥ 11,0 µg/kg)	(≥ 11,0 µg/kg)	(≥ 11,0 µg/kg)	Naproxeno	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg		Caprino	Conejo	Pavo	Ác. Mefenámico	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	Ác. salicílico	(≥ 160µg/kg)	(≥ 160µg/kg)	(≥ 160 µg/kg)	Ác. tolfenámico	CCα = 20,0 µg/kg	CCα = 20,0 µg/kg	CCα = 20,0 µg/kg	Carprofeno	CCα = 200 µg/kg	CCα = 200 µg/kg	CCα = 200 µg/kg	Fenilbutazona	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	Flunixin	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	Meloxicam	(≥ 11,0 µg/kg)	(≥ 11,0 µg/kg)	CCα = 8,0 µg/kg	Naproxeno	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	Ác. Mefenámico	CCα = 4,0 µg/kg	Ác. salicílico	CCα = 160µg/kg	Ác. tolfenámico	CCα = 20,0 µg/kg	Carprofeno	CCα = 200 µg/kg	Fenilbutazona	CCα = 4,0 µg/kg	Flunixin	CCα = 4,0 µg/kg	Meloxicam	CCα = 8,0 µg/kg	Naproxeno	CCα = 4,0 µg/kg	<p>Met/QR/AinesLeche/1 Met/QR/AinesMúsculo/1</p> <p><i>Métodos internos conforme a Decisión 2002/657/CE</i></p>
	Ovino	Bovino	Caprino																																																																																																															
Ác. Tolfenámico	CCα=15,0 µg/kg	(≥ 25,0 µg/kg)	CCα=15,0 µg/kg																																																																																																															
Fenilbutazona	CCα=1,5 µg/kg	CCα=1,5 µg/kg	CCα=1,5 µg/kg																																																																																																															
Meloxicam	CCα= 4,5 µg/kg	(≥ 6,0 µg/kg)	(≥ 6,0 µg/kg)																																																																																																															
Ác. mefenámico	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg																																																																																																															
Naproxeno	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg	CCα= 3,0 µg/kg																																																																																																															
	Bovino	Equino	Porcino																																																																																																															
Ác. Mefenámico	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
Ác. salicílico	(≥ 160µg/kg)	(≥ 160µg/kg)	CCα = 160 µg/kg																																																																																																															
Ác. tolfenámico	(≥ 30 µg/kg)	CCα = 20,0 µg/kg	(≥ 30 µg/kg)																																																																																																															
Carprofeno	(≥ 282 µg/kg)	(≥ 282 µg/kg)	CCα = 200 µg/kg																																																																																																															
Fenilbutazona	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
Flunixin	(≥ 6,0 µg/kg)	(≥ 6,0 µg/kg)	(≥ 6,0 µg/kg)																																																																																																															
Meloxicam	(≥ 11,0 µg/kg)	(≥ 11,0 µg/kg)	(≥ 11,0 µg/kg)																																																																																																															
Naproxeno	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
	Caprino	Conejo	Pavo																																																																																																															
Ác. Mefenámico	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
Ác. salicílico	(≥ 160µg/kg)	(≥ 160µg/kg)	(≥ 160 µg/kg)																																																																																																															
Ác. tolfenámico	CCα = 20,0 µg/kg	CCα = 20,0 µg/kg	CCα = 20,0 µg/kg																																																																																																															
Carprofeno	CCα = 200 µg/kg	CCα = 200 µg/kg	CCα = 200 µg/kg																																																																																																															
Fenilbutazona	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
Flunixin	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
Meloxicam	(≥ 11,0 µg/kg)	(≥ 11,0 µg/kg)	CCα = 8,0 µg/kg																																																																																																															
Naproxeno	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																															
Ác. Mefenámico	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																																	
Ác. salicílico	CCα = 160µg/kg																																																																																																																	
Ác. tolfenámico	CCα = 20,0 µg/kg																																																																																																																	
Carprofeno	CCα = 200 µg/kg																																																																																																																	
Fenilbutazona	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																																	
Flunixin	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																																	
Meloxicam	CCα = 8,0 µg/kg																																																																																																																	
Naproxeno	CCα = 4,0 µg/kg																																																																																																																	

CCα: Límite de decisión según la Decisión de la Comisión 2002/657/CE (DOCE 17/08/2002).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO																												
Suplementos alimenticios para desarrollo muscular	<p>Determinación cualitativa de hormonas anabolizantes esteroideas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)</p> <p style="text-align: right;">Límite de detección</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>17α-Boldenona</td><td style="text-align: right;">0,30 μg/g</td></tr> <tr><td>17β-Boldenona</td><td style="text-align: right;">0,30 μg/g</td></tr> <tr><td>17 α-Trembolona</td><td style="text-align: right;">0,15 μg/g</td></tr> <tr><td>17β-Trembolona</td><td style="text-align: right;">0,60 μg/g</td></tr> <tr><td>4-Cloro Dehidrometil Testosterona</td><td style="text-align: right;">1,46 μg/g</td></tr> <tr><td>Dehidro Epiandrosterona</td><td style="text-align: right;">6,29 μg/g</td></tr> <tr><td>Madol</td><td style="text-align: right;">4,68 μg/g</td></tr> <tr><td>Mesterolona</td><td style="text-align: right;">15,00 μg/g</td></tr> <tr><td>Metasterona</td><td style="text-align: right;">6,28 μg/g</td></tr> <tr><td>Metiltestosterona</td><td style="text-align: right;">1,45 μg/g</td></tr> <tr><td>Metilestenbolona</td><td style="text-align: right;">1,47 μg/g</td></tr> <tr><td>Propionato de Testosterona</td><td style="text-align: right;">0,60 μg/g</td></tr> <tr><td>Testosterona</td><td style="text-align: right;">1,41 μg/g</td></tr> <tr><td>2,3-TioepoxiMadol</td><td style="text-align: right;">5,44 μg/g</td></tr> </table>	17 α -Boldenona	0,30 μ g/g	17 β -Boldenona	0,30 μ g/g	17 α -Trembolona	0,15 μ g/g	17 β -Trembolona	0,60 μ g/g	4-Cloro Dehidrometil Testosterona	1,46 μ g/g	Dehidro Epiandrosterona	6,29 μ g/g	Madol	4,68 μ g/g	Mesterolona	15,00 μ g/g	Metasterona	6,28 μ g/g	Metiltestosterona	1,45 μ g/g	Metilestenbolona	1,47 μ g/g	Propionato de Testosterona	0,60 μ g/g	Testosterona	1,41 μ g/g	2,3-TioepoxiMadol	5,44 μ g/g	<p>Met/QR/Esteroides/1</p> <p><i>Método interno basado en Determination of anabolic steroids in dietary supplements by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. C Van Poucke. Analytica Chimica Acta 2007</i></p>
17 α -Boldenona	0,30 μ g/g																													
17 β -Boldenona	0,30 μ g/g																													
17 α -Trembolona	0,15 μ g/g																													
17 β -Trembolona	0,60 μ g/g																													
4-Cloro Dehidrometil Testosterona	1,46 μ g/g																													
Dehidro Epiandrosterona	6,29 μ g/g																													
Madol	4,68 μ g/g																													
Mesterolona	15,00 μ g/g																													
Metasterona	6,28 μ g/g																													
Metiltestosterona	1,45 μ g/g																													
Metilestenbolona	1,47 μ g/g																													
Propionato de Testosterona	0,60 μ g/g																													
Testosterona	1,41 μ g/g																													
2,3-TioepoxiMadol	5,44 μ g/g																													
Grasa perirenal animal	<p>Determinación cualitativa de gestágenos por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Acetato clormadiona</td><td style="text-align: right;">CCα = 0,50 μg/kg</td></tr> <tr><td>Acetato medroxiprogesterona</td><td style="text-align: right;">CCα = 0,25 μg/kg</td></tr> <tr><td>Acetato megestrol</td><td style="text-align: right;">CCα = 0,25 μg/kg</td></tr> <tr><td>Acetato melengestrol</td><td style="text-align: right;">CCα = 0,25 μg/kg</td></tr> </table>	Acetato clormadiona	CC α = 0,50 μ g/kg	Acetato medroxiprogesterona	CC α = 0,25 μ g/kg	Acetato megestrol	CC α = 0,25 μ g/kg	Acetato melengestrol	CC α = 0,25 μ g/kg	<p>Met/QR/Gestagenos/1</p> <p><i>Método interno conforme a Decisión 2002/657/CE</i></p>																				
Acetato clormadiona	CC α = 0,50 μ g/kg																													
Acetato medroxiprogesterona	CC α = 0,25 μ g/kg																													
Acetato megestrol	CC α = 0,25 μ g/kg																													
Acetato melengestrol	CC α = 0,25 μ g/kg																													

CC α : Límite de decisión según la Decisión de la Comisión 2002/657/CE (DOCE 17/08/2002).

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	
Frutas y hortalizas con alto contenido en agua y bajo en grasa Aceites Vino Miel (LPE)⁽¹⁾	Productos vegetales con bajo contenido en agua, alto contenido en almidón y/o proteínas no grasos Músculo Grasa animal
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	
Met/QR/Quechers-GC/1 Met/QR/Quechers-GC/2 Met/QR/Quechers-GC/3 Met/QR/Quechers-GC/4 Met/QR/Quechers-GC/5 Met/QR/Quechers-OCL/1 Met/QR/Vino/1 Rev. 10	<i>Métodos internos basados en</i> <i>UNE-EN 15662</i> <i>Método interno</i>
ENSAYO	
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG-MS/MS)	
Acrinatrina Alacloro Aldrín y Dieldrín Azoxistrobina Benalaxil Bifentrina Bitertanol Boscalida Bromopropilato Bupirimato Butralina Ciproconazol Ciprodinilo Clordano Clorfenapir Clorfenvinfós Clorpirifos Clorpirifós-metilo Clortal dimetil Cresoxim-metilo DDT Diazinón Diclorvos Dicofol	Dietofencarb Difenoconazol Diflufenicán Diniconazol Endosulfan Endrin Endrin ketone EPN Epoconazol Espiromesifeno Epiroamina Etalfluralina Etion Etofenprox Etofumesato Etoxazol Fempropatrina Fenamidona Fenamifos Fenarimol Fenazaquina Fenbuconazol Fenitrotión Fenpropidina
Fenpropimorfo Fention Fentoato Fenvalerato (incl. Esfenvalerato) Fipronil (Incl. F.Sulfona [MB46136]) Fipronil desulfinyl Fluazifop-P-butyl Fludioxonilo Fluopiram Fluquinconazol Flusilazol Flutolanil Flutriafol Fonofos Forato Fosalón Heptacloro (incl. Heptacloro-epóxido) Hexaclorobenceno Hexaclorociclohexano (HCH) alfa Hexaclorociclohexano (HCH) beta Hexaclorociclohexano (HCH) delta Hexazinone Isocarbophos Isofenphos	Isofenphos-methyl Isoprotiolano Lambda-cihalotrina Lindano Metalaxilo (incl. metalaxilo-M) Metoxicloro Miclobutanil Nitrofenol Nuarimol Oxiclordano Oxifluorfen Paclbutrazol Paratión Pendimetalina Permetrin Piperonyl butoxide Piridabén Pirimetanol Pirimicarb Pirimifos-metil Procimidona Profenofós Prometryn Propargita
Propiconazol Prothiofos Pyridaphenthion Pyrifeno Quinalfós Quinoxifeno Sulfotep Tau fluvalinato Tebuconazol Tebufenpirad Teflutrina Terbumeton Tetraconazol Tetradifón Tolclofos metil Triadimefón Triadimenol Triatato Triazofos Trifloxistrobina Trifluralina Vinclozolina	

(1) El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC".

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC