



Félix Jiménez Flaño
(Grupo Cultural Micológico Verpa)

BOLETO RETICULADO

Boletus aestivalis . Fr.= *Boletus reticulatus* Schaeff

Clase: Basidiomicetos

Orden: Boletales

Familia: Boletáceas

Descripción

Es muy similar a *Boletus edulis*. También es de color claro y posee un retículo bien marcado en el pie. La cutícula es seca y aterciopelada y se cuartea con facilidad

Hábitat

De forma general crecen durante el verano, por ello se agusan con frecuencia. De forma general muy abundante en los castaños y diversos robledales, tanto de roble del país (*Q. robur*), como albar (*Q. petraea*), rebollo (*Quercus pyrenaica*). Se encuentra también con profusión en los encinares y robledales sobre terreno silíceo. En las masas forestales situadas en climas de transición y suelos teóricamente no aptos, se producen fructificaciones masivas.

Es heliófilo, escoge zonas con claridad, si el arbolado está muy espeso, la entrada de luz es escasa y aunque las micorrizas están presentes no fructifica.

Siendo clasificado de más escaso en la Reserva por los recolectores en los encinares. Si que aparece en el verano con las tormentas en los hayedos y en menor medida en Robledales de *Quercus pyrenaica*.