



Carlos M. Pérez del Amo
(Grupo Cultural Micológico Verpa) Boletus edulis.

HONGO BLANCO

Clase: Basidiomicetos

Orden: Boletales

Familia: Boletáceas

Descripción

Es un hongo robusto y macizo. El sombrero mide hasta 25 cm de diámetro y el pie, grueso y panzudo, de 5 a 12 cm de longitud y hasta 7 cm de grueso. El color de la superficie del sombrero es pardo claro o canela. Los poros al principio son blancos, más tarde amarillentos y terminan de color verdoso, siempre fáciles de separar del sombrero. El pie es de color pardo con un fino retículo. Las esporas son amarillentas y la esporada aceitunada.

Hábitat

De forma general en montes de pinos, robles y hayas desde el verano a principios del invierno, en terrenos silíceos y no muy secos de más de 550 mm de precipitación anual. Es más abundante en sustratos procedentes de la degradación de areniscas y conglomerados de cuarcitas con areniscas, así como granitos y gneis. Los suelos deben ser ácidos o subácidos.

En España las mayores producciones de este hongo se cifran entre 100 y 400 kg./ha y años muy favorables. A nivel general en comarcas enteras con hábitat adecuado se alcanzan medias corrientes cercanas a los 30 kg./ha y año sobre areniscas con 650 a 850 mm de precipitación anual y hasta los 1.500 m de altitud.

En La Reserva sólo se ha constatado su presencia en la región más occidental en los pinares y hayedos, con altitudes superiores a los 900 metros y con preferencia en pinares y hayedos con sotobosque de ericáceas.

