



Carlos M. Pérez del Amo. (Grupo Cultural Micológico Verpa) .

HONGO ROJO *Boletus pinicola* (Vitt.) Venturi

Clase: Basidiomicetos

Orden: Boletales

Familia: Boletáceas

Descripción

Boletus pinicola es una especie muy similar a *Boletus edulis*, cuya diferencia fundamental es que la cutícula presenta un tono rojizo, es seca y aterciopelada de joven y más tarde brillante y algo húmeda. El pie, también grueso y macizo, primero blanquecino y más tarde amarronado, con una retícula rojiza. La carne es rosada bajo la cutícula del sombrero.

Hábitat

De forma general aparece ya en primavera (mayo y junio) y durante el verano, pudiéndose recoger hasta últimos de diciembre en pinares de *Pinus radiata*. Brota abundantemente en los pinares, abetales y hayedos ácidos.

Preferentemente fructifican en zonas compuestas por arbolado aclarado, suelo poco profundo formado por gravilla fina, estrato compuesto por brezos alternando con musgo.

Curiosidades

En La Reserva comparte hábitat con *Boletus edulis* apareciendo en terrenos de algo menos de altitud. Principalmente aparece en junio y julio hasta septiembre en incluso en Navidad en años calurosos.