



Félix Jiménez Flaño,
(Grupo Cultural Micológico Verpa)

ROVELLÓN, REBOLLÓN *Lactarius deliciosus* Fr., *L. sanguifluus* Paulet

Clase: Basidiomicetos

Orden: Rossulales

Familia: Rossuláceas

Descripción

Hongo de color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4 a 12 cm de diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. Al principio, el margen se encuentra enrollado y más tarde se extiende. El pie es corto, cilíndrico y - en seguida - hueco, también de color naranja y con pequeñas manchas. Las láminas, del mismo color asalmonado, pueden mancharse de verde cuando se rompen. Al cortarlo segregan en todas sus partes un látex o líquido lechoso anaranjado que posteriormente se oxida y pasa a verde cardenillo muy peculiar. Incluso las redes de micelio en el suelo y las micorizas en contacto con las raicillas del pino poseen látex naranja inconfundible..

Hábitat

Se asocia con las raíces de los pinos formando ectomicorizas en terrenos con abundantes matorrales como biércol (*Calluna vulgaris* y *Erica vagans*), gayuba (*Arctostaphylos uva-ursi*), estrepas (*Cistus laurifolius*), ginebros (*Juniperus communis*), hierbas turmeras (*Tuberaria vulgaris*), etc. También en terrenos cubiertos de pinocha o zarabuja y sin prácticamente vegetación herbácea o subarbustiva.

Abunda más en terrenos sueltos, bien drenados y arenosos procedentes de la degradación de areniscas, granitos, cuarcitas, pizarras y esquistos.

Especie heliófila propia de montes bien iluminados, tanto en masas muy jóvenes de apenas 5 años como en adultas de más de 100. En las masas de *Pinus sylvestris* resulta más frecuente en el entorno de caminos, claros y rasos.

Fructifica desde el final del verano y en otoño, desde finales de agosto a diciembre, siendo el mejor mes octubre. Más raramente aparece en junio y julio. Cuando se producen precipitaciones otoñales copiosas, desde mediados de septiembre hasta mitades de noviembre, la florada otoñal de *Lactarius deliciosus* resulta más abundante.

En ocasiones se la puede encontrar avanzado el invierno, especialmente en pinares mediterráneos de *Pinus halepensis* y *Pinus pinea* en comarcas termófilas.

Una especie similar al rovellón del pino laricio que crece asociada a este pino en terrenos calizos es *Lactarius sanguifluus*. Su látex es de color sangre. Es también comestible apreciado y con frecuencia aparece mezclado junto con *Lactarius deliciosus*.

Curiosidades

Aparece de forma común en todos los valles de la Reserva, existiendo pinares con una gran producción en el valle del Alhama, Linares y Jubera. Hasta hace 10 años era recogido exclusivamente por catalanes, pero ahora son muchos los recolectores de Logroño y de comarcas limítrofes que lo recogen.