



Fermín Ezquerro

CESPAÑO, CRISPILLA, PATORRILLA *Morchella esculenta*.

Clase: Basidiomicetos

Orden: Tricholomatales

Familia: Amanitáceas

Descripción

De forma oval o globosa, semejando una piña, con alveolos parecidos a los de los panales de las colmenas. El color es amarillento o similar al de la cera. Posee un pie de superficie lisa y de 3 a 6 cm de longitud. Tanto el sombrero como el pie son huecos. Las esporas son transparentes y elípticas..

Hábitat

De forma general aparece en primavera entre la hojarasca y la hierba en sotos y montes de alamedas, olmedas, fresnedas y otros bosques de ribera, así como en terrenos abiertos. También en huertos, jardines, solares e incluso ruinas y vertederos con papeles viejos. A veces aparece en abundancia en lugares donde se han vertido los restos de los orujos de la fabricación de vino o sidra, así como en lugares incendiados.

Otra variedad es ***Morchella rotunda***, de sombrero más globoso, que puede encontrarse en algunos encinares de la zona. Existen también variedades de sombrero oscuro, propias de alisedas, abedulares y pinares, como ***Morchella conica***.

Curiosidades

Todas son comestibles muy sabrosas, siempre que no se tomen crudas. Los precios que alcanzan son de los más elevados pero las cantidades recogidas presentan una gran irregularidad.

La especie ***Morchella conica*** presenta un sombrerillo de color marrón oscuro que con el tiempo se ennegrece.

A nivel mundial el comercio de las colmenillas (Morel en inglés) ha alcanzado tal nivel que se cosechan y comercializan millones de toneladas procedentes de países de América (muy abundantes en los bosques boreales), así como de Asia (India, Pakistán, China, etc.) y la mayor parte de Europa.

En la Reserva es conocida desde antiguo como cespaño en la comarca de Cervera del Río Alhama donde es preferida a la de chopo, principalmente en Aguilar del Río Alhama y en los pueblos de alrededor, donde se recoge en los encinares. También se recoge en las riveras donde parece mostrar cierta preferencia por los olmos y localmente también se recoge en los valles del Cidacos en las zonas de arenas de río. Se desconoce en el Valle del Leza y Jubera.