



Fermín Ezquerro.
NEGRILLA

Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Quel.

Clase: Basidiomicetos

Orden: Tricholomatales

Familia: Tricholomaceae

Descripción

Sombrero de 4 a 8 cm de diámetro de superficie grisácea oscura con fibras radiales que parecen pelo, de donde le viene el nombre popular de ratón. Láminas apretadas y escotadas, de color gris blanquecino igual que el pie. Este es de 3 a 7 cm de longitud. Su carne es muy frágil y blanquecina aunque en algunos ejemplares viejos ennegrece o toma algún tinte rojizo. Las esporas son elipsoidales y la esporada, blanca.

Hábitat

Aparece con gran profusión en los pinares - tanto naturales como de repoblación - de todas las especies, incluso en los de pino carrasco. A veces alfombra el suelo de tal manera que se llega a producciones de más de 500 Kg por ha.

Es muy frágil y de fácil rotura por lo que el transporte es el principal problema en su comercialización. Es muy apreciado por los catalanes y es de potencial más que interesante al ser extremadamente común en tiempo frío, cuando otras especies ya no pueden salir.

Aunque puede aparecer en primavera y verano, prolifera mucho más en otoño y principios de invierno, incluso en enero, tolerando el frío y las heladas, de donde deriva el nombre catalán de fredolic.

Curiosidades

En la Reserva su presencia es más abundante hacia el oeste en toda clase de pinares.