
La Tuberculosis en España:
Situación Actual y Guía de Prevención

SERVICIO de PREVENCIÓN de RIESGOS LABORALES



Enfermedad infecciosa bacteriana (*Mycobacterium tuberculosis*) que afecta mayoritariamente a los pulmones, desarrollándose lentamente.

TRANSMISIÓN POR VÍA AÉREA

Se contagia a través de gotitas expulsadas al aire por personas enfermas al habiar, toser o estornudar.



El riesgo mayor reside en personas que conviven o tienen contacto regular y prolongado.

SÍNTOMAS DE ALERTA Y DIAGNÓSTICO



Tos persistente (+2-3 semanas)



Fiebre



Sudoración nocturna



Cansancio estremo



Pérdida de peso o apetito




Valoración clínica

Radiografia de tórax



Análisis de esputo



Prueba de la tuberculina (Mantoux) o QUANTIFERON (SANGRE)

El retraso diagnóstico es un reto. Acudir al médico pronto es vital para evitar complicaciones y frenar la cadena de contagio.

ESTADÍSTICAS NACIONALES (2023)

TOTAL DE CASOS AUTÓCTONOS:

3.944

(Aumento del 7% respecto a 2022)



TASA DE NOTIFICACIÓN:

8,2 casos

por cada 100.000 habitantes

PERFIL POR SEXO





ORIGEN DE LOS CASOS:

Pacientes nacidos fuera de España se aproxima al **50%** **del total**

RESUMEN REGIONAL 2023

(TN: Tasa de Notificación)

MAYOR INCIDENCIA
- Alta Ceuta (28,9)
- Alta Melilla (14,0)
- Alta Cataluña (12,3)
- Alta Galicia (11,2)

MENOR INCIDENCIA
- Baja Navarra (5,1)
- Baja Canarias (5,3)
- Baja Extremadura (5,7)
- Baja C. Valenciana (5,9)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO





ÉXITO DEL TRATAMIENTO:

82,5% (2022)

Requiere cumplimiento estricto durante meses para evitar resistencias (MDR)

Fin de la contagiosidad: Tras 2 o 3 semanas de tratamiento correcto.