

# *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr.

## Carbonera

Es una especie frecuente en general y también en el Parque, aunque no excesivamente abundante. Podemos encontrarla desde finales de primavera a inicios del otoño en bosques de planifolios.



Hayedo, El Achichuelo, Villoslada de Cameros, julio de 2006.

**Sombbrero:** de 5 a 12 cm de diámetro, inicialmente globoso, más tarde convexo, extendido o ligeramente deprimido. De coloración muy variable: violeta, verde grisácea, azul violácea, con decoloraciones verdes o amarillas, pero manteniendo siempre alguna zona de color violáceo.

**Himeno:** láminas apretadas, gruesas, adherentes, bifurcadas. De color blanco y consistencia elástica, por lo que vuelven a su posición inicial al apoyar el dedo sobre ellas, denominándose lardáceas. Esporada blanca.

**Pie:** de 4-9 X 1,5-3 cm, grueso, cilíndrico o ligeramente atenuado en la base, carnoso y firme. De color blanco, en ocasiones, con reflejos violáceos.

**Carne:** dura, blanca, violácea bajo la cutícula. Sabor dulce, sin olor característico. No reacciona al sulfato de hierro (SO<sub>4</sub>Fe).

**MICROSCOPIA:** esporas anchamente elipsoides, de 6,5-9 X 5,5-7  $\mu$ m, verrugosas, amiloides.

**CONFUSIONES:** *Russula cyanoxantha* f. *peltereai*, de aspecto similar y dimensiones ligeramente mayores, se distingue por su colorido verde predominante, también es comestible. *Russula langei*, de dimensiones ligeramente inferiores, es de textura más dura y láminas de color crema. Otras especies del género pueden parecerse a simple vista, pero la consistencia de las láminas y el sabor dulce de la especie aquí tratada nos ayudará a identificarla.

**VALOR CULINARIO:** excelente comestible.